



## Nachsorge bei Tumorstadium <= pT2 pN0 cM0

Zeit nach Zystektomie in Monaten

	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	Jährlich
Diagnostik												
Labor und Blutgasanalyse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Urinkultur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Urinzytologie		X	X	X	X		X		X		X	X
Spülzytologie Urethra (1)			X		X		X		X		X	
Vitamin B12 (2)							X		X		X	X
Sonographie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CT ThoraX/ Abdomen incl. Urographie	(X)	X	X	X	X		X		X		X	X(3)
Stomakontrolle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anamnese Kontinenz und Sexualfunktion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anamnese Psychoonkologischer Sozialstatus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

© Forum-Blasenkrebs Online-Selbsthilfegruppe

Legende: (1) = defunktionalisierte Urethra, (2) = nur bei kontinenter Ableitung, (3) = bei Rezidivverdacht, Schmerz, Hydronephrose und pos. Zytologie, (X) = wenn nicht vor Zystektomie durchgeführt

**Nach dem Leitlinienprogramm Onkologie | Kurzversion S3-Leitlinie Blasenkarzinom | September 2016**